

# Relaciones III

**José de Jesús Lavalle Martínez**

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
Facultad de Ciencias de la Computación  
Estructuras Discretas CCOS 009

- 1 Motivación
- 2 Concepto de Cerradura
- 3 Cerradura Reflexiva
- 4 Cerradura Simétrica
- 5 Rutas en grafos dirigidos
- 6 Cerradura Transitiva
- 7 Ejercicios

- Una red de computadoras tiene centros de datos en Boston, Chicago, Denver, Detroit, Nueva York y San Diego.

- Hay líneas telefónicas directas unidireccionales de Boston a Chicago, de Boston a Detroit, de Chicago a Detroit, de Detroit a Denver y de Nueva York a San Diego.

- Sea  $R$  la relación que contiene  $(a, b)$  si hay una línea telefónica desde el centro de datos en  $a$  hasta el de  $b$ .

- ¿Cómo podemos determinar si existe algún enlace (posiblemente indirecto) compuesto por una o más líneas telefónicas de un centro a otro?

- Debido a que no todos los enlaces son directos, como el enlace de Boston a Denver que pasa por Detroit,  $R$  no se puede utilizar directamente para responder a esto.

- En el lenguaje de las relaciones,  $R$  no es transitiva, por lo que no contiene todos los pares que se pueden vincular.



- Como mostraremos en esta sección, podemos encontrar todos los pares de centros de datos que tienen un enlace al construir una relación transitiva  $S$  que contenga  $R$  tal que  $S$  sea un subconjunto de toda relación transitiva que contenga  $R$ .

- Aquí,  $S$  es la relación transitiva más pequeña que contiene  $R$ . Esta relación se llama **cerradura transitiva** de  $R$ .

- Si  $R$  es una relación sobre un conjunto  $A$ , puede tener o no alguna propiedad  $P$ , como reflexividad, simetría o transitividad.

- Cuando  $R$  no tiene la propiedad  $P$ , nos gustaría encontrar la relación más pequeña  $S$  sobre  $A$  con la propiedad  $P$  que contiene  $R$ .

## Definición 1

Si  $R$  es una relación sobre un conjunto  $A$ , entonces la *cerradura* de  $R$  con respecto a  $P$ , si existe, es la relación  $S$  sobre  $A$  con la propiedad  $P$  que contiene  $R$  y es un subconjunto de cada subconjunto de  $A \times A$  que contiene  $R$  con propiedad  $P$ .

- Si hay una relación  $S$  que es un subconjunto de cada relación que contiene  $R$  con propiedad  $P$ , debe ser única.

- Para ver esto, suponga que las relaciones  $S$  y  $T$  tienen la propiedad  $P$  y son subconjuntos de toda relación con la propiedad  $P$  que contiene  $R$ .

- Entonces,  $S$  y  $T$  son subconjuntos entre sí y, por lo tanto, son iguales.



- Tal relación, si existe, es la relación más pequeña con la propiedad  $P$  que contiene  $R$  porque es un subconjunto de toda relación con la propiedad  $P$  que contiene  $R$ .

- Mostraremos cómo se pueden encontrar cerraduras reflexivas, simétricas y transitivas de relaciones.

- La relación  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  no es reflexiva.

- La relación  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  no es reflexiva.
- ¿Cómo podemos producir una relación reflexiva que contenga  $R$  que sea lo más pequeña posible?

- La relación  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  no es reflexiva.
- ¿Cómo podemos producir una relación reflexiva que contenga  $R$  que sea lo más pequeña posible?
- Esto se puede hacer agregando  $(2, 2)$  y  $(3, 3)$  a  $R$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(a, a)$  que no están en  $R$ .

- La relación  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  no es reflexiva.
- ¿Cómo podemos producir una relación reflexiva que contenga  $R$  que sea lo más pequeña posible?
- Esto se puede hacer agregando  $(2, 2)$  y  $(3, 3)$  a  $R$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(a, a)$  que no están en  $R$ .
- Esta nueva relación contiene  $R$ .

- La relación  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  no es reflexiva.
- ¿Cómo podemos producir una relación reflexiva que contenga  $R$  que sea lo más pequeña posible?
- Esto se puede hacer agregando  $(2, 2)$  y  $(3, 3)$  a  $R$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(a, a)$  que no están en  $R$ .
- Esta nueva relación contiene  $R$ .
- Además, cualquier relación reflexiva que contiene  $R$  también debe contener  $(2, 2)$  y  $(3, 3)$ .

- Debido a que esta relación contiene  $R$ , es reflexiva y está contenida dentro de cada relación reflexiva que contiene  $R$ , se denomina **cerradura reflexiva** de  $R$ .



- Como ilustra este ejemplo, dada una relación  $R$  sobre un conjunto  $A$ , la cerradura reflexiva de  $R$  se puede formar sumando a  $R$  todos los pares de la forma  $(a, a)$  con  $a \in A$ , que no estaban en  $R$ .

- La suma de estos pares produce una nueva relación que es reflexiva, contiene  $R$ , y está contenida dentro de cualquier relación reflexiva que contiene  $R$ .

- Vemos que la cerradura reflexiva de  $R$  es igual a  $R \cup \Delta$ , donde  $\Delta = \{(a, a) \mid a \in A\}$  es la **relación diagonal** en  $A$ .

## Ejemplo 1

¿Cuál es la cerradura reflexiva de la relación  $R = \{(a, b) \mid a < b\}$  sobre el conjunto de números enteros?

## Ejemplo 1

¿Cuál es la cerradura reflexiva de la relación  $R = \{(a, b) | a < b\}$  sobre el conjunto de números enteros?

*Solución:* La cerradura reflexiva de  $R$  es

$$R \cup \Delta = \{(a, b) | a < b\} \cup \{(a, a) | a \in \mathbb{Z}\} = \{(a, b) | a \leq b\}.$$



- La relación

$$\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

en  $\{1, 2, 3\}$  no es simétrica.

- La relación

$$\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

en  $\{1, 2, 3\}$  no es simétrica.

- ¿Cómo podemos producir una relación simétrica que sea lo más pequeña posible y contenga  $R$ ?

- La relación

$$\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

en  $\{1, 2, 3\}$  no es simétrica.

- ¿Cómo podemos producir una relación simétrica que sea lo más pequeña posible y contenga  $R$ ?
- Para hacer esto, solo necesitamos sumar  $(2, 1)$  y  $(1, 3)$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(b, a)$  con  $(a, b) \in R$  que no están en  $R$ .



- La relación

$$\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

en  $\{1, 2, 3\}$  no es simétrica.

- ¿Cómo podemos producir una relación simétrica que sea lo más pequeña posible y contenga  $R$ ?
- Para hacer esto, solo necesitamos sumar  $(2, 1)$  y  $(1, 3)$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(b, a)$  con  $(a, b) \in R$  que no están en  $R$ .
- Esta nueva relación es simétrica y contiene  $R$ .

- La relación

$$\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

en  $\{1, 2, 3\}$  no es simétrica.

- ¿Cómo podemos producir una relación simétrica que sea lo más pequeña posible y contenga  $R$ ?
- Para hacer esto, solo necesitamos sumar  $(2, 1)$  y  $(1, 3)$ , porque estos son los únicos pares de la forma  $(b, a)$  con  $(a, b) \in R$  que no están en  $R$ .
- Esta nueva relación es simétrica y contiene  $R$ .
- Además, cualquier relación simétrica que contiene  $R$  debe contener esta nueva relación, porque una relación simétrica que contiene  $R$  debe contener  $(2, 1)$  y  $(1, 3)$ .

- En consecuencia, esta nueva relación se denomina **cerradura simétrica** de  $R$ .

- Como ilustra este ejemplo, la cerradura simétrica de una relación  $R$  se puede construir sumando todos los pares ordenados de la forma  $(b, a)$ , donde  $(a, b)$  está en la relación, que no están ya presentes en  $R$ .

- Sumando estos pares produce una relación que es simétrica, que contiene  $R$ , y que está contenida en cualquier relación simétrica que contiene  $R$ .

- La cerradura simétrica de una relación se puede construir tomando la unión de una relación con su inversa, es decir,  $R \cup R^{-1}$  es la cerradura simétrica de  $R$ , donde  $R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$ .

## Ejemplo 2

¿Cuál es la cerradura simétrica de la relación  $R = \{(a, b) | a > b\}$  en el conjunto de enteros positivos?

## Ejemplo 2

¿Cuál es la cerradura simétrica de la relación  $R = \{(a, b) | a > b\}$  en el conjunto de enteros positivos?

*Solución:* La cerradura simétrica de  $R$  es la relación

$$R \cup R^{-1} = \{(a, b) | a > b\} \cup \{(b, a) | a > b\} = \{(a, b) | a \neq b\}.$$



## Ejemplo 2

¿Cuál es la cerradura simétrica de la relación  $R = \{(a, b) | a > b\}$  en el conjunto de enteros positivos?

*Solución:* La cerradura simétrica de  $R$  es la relación

$$R \cup R^{-1} = \{(a, b) | a > b\} \cup \{(b, a) | a > b\} = \{(a, b) | a \neq b\}.$$

Esta última igualdad se sigue porque  $R$  contiene todos los pares ordenados de enteros positivos, donde el primer elemento es mayor que el segundo elemento, y  $R^{-1}$  contiene todos los pares ordenados de enteros positivos, donde el primer elemento es menor que el segundo.

- Suponga que una relación  $R$  no es transitiva.

- ¿Cómo podemos producir una relación transitiva que contenga  $R$  de manera que esta nueva relación esté contenida dentro de cualquier relación transitiva que contenga  $R$ ?

- ¿Puede producirse la cerradura transitiva de una relación  $R$  sumando todos los pares de la forma  $(a, c)$ , donde  $(a, b)$  y  $(b, c)$  ya están en la relación?

- Considere la relación  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ .

- Considere la relación  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ .
- Esta relación no es transitiva porque no contiene todos los pares de la forma  $(a, c)$  donde  $(a, b)$  y  $(b, c)$  están en  $R$ .

- Considere la relación  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ .
- Esta relación no es transitiva porque no contiene todos los pares de la forma  $(a, c)$  donde  $(a, b)$  y  $(b, c)$  están en  $R$ .
- Los pares de esta forma que no están en  $R$  son  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$  y  $(3, 1)$ .

- Considere la relación  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  sobre el conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ .
- Esta relación no es transitiva porque no contiene todos los pares de la forma  $(a, c)$  donde  $(a, b)$  y  $(b, c)$  están en  $R$ .
- Los pares de esta forma que no están en  $R$  son  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$  y  $(3, 1)$ .
- Sumar estos pares no produce una relación transitiva, porque la relación resultante contiene  $(3, 1)$  y  $(1, 4)$  pero no contiene  $(3, 4)$ .



- Esto muestra que construir la cerradura transitiva de una relación es más complicado que construir las cerraduras reflexiva o simétrica.

- El resto de esta sección desarrolla algoritmos para construir cerraduras transitivas.

- Como se mostrará más adelante en esta sección, la cerradura transitiva de una relación se puede encontrar agregando nuevos pares ordenados que deben estar presentes y luego repitiendo este proceso hasta que no se necesiten nuevos pares ordenados.

- Veremos que representar relaciones mediante grafos dirigidos ayuda en la construcción de cerraduras transitivas.

- A continuación, presentamos algunos términos que usaremos para este propósito.

- Una ruta (o camino) en un grafo dirigido se obtiene atravesando las aristas (en la misma dirección que indica la flecha en la arista).

## Definición 2

Una *ruta* (o *camino*) de  $a$  a  $b$  en el grafo dirigido  $G$  es una secuencia de aristas  $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$  en  $G$ , donde  $n$  es un número entero no negativo,  $x_0 = a$  y  $x_n = b$ , es decir, una secuencia de aristas donde el vértice terminal de una arista es el mismo que el vértice inicial en la siguiente arista de la ruta. Esta ruta se denota por  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$  y tiene una longitud  $n$ . Vemos el conjunto vacío de aristas como una ruta de longitud cero de  $a$  a  $a$ . Una ruta de longitud  $n \geq 1$  que comienza y termina en el mismo vértice se llama *circuito* o *ciclo*.

## Definición 2

Una *ruta* (o *camino*) de  $a$  a  $b$  en el grafo dirigido  $G$  es una secuencia de aristas  $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$  en  $G$ , donde  $n$  es un número entero no negativo,  $x_0 = a$  y  $x_n = b$ , es decir, una secuencia de aristas donde el vértice terminal de una arista es el mismo que el vértice inicial en la siguiente arista de la ruta. Esta ruta se denota por  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$  y tiene una longitud  $n$ . Vemos el conjunto vacío de aristas como una ruta de longitud cero de  $a$  a  $a$ . Una ruta de longitud  $n \geq 1$  que comienza y termina en el mismo vértice se llama *circuito* o *ciclo*.

- Una ruta en un grafo dirigido puede pasar por un vértice más de una vez.



## Definición 2

Una *ruta* (o *camino*) de  $a$  a  $b$  en el grafo dirigido  $G$  es una secuencia de aristas  $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$  en  $G$ , donde  $n$  es un número entero no negativo,  $x_0 = a$  y  $x_n = b$ , es decir, una secuencia de aristas donde el vértice terminal de una arista es el mismo que el vértice inicial en la siguiente arista de la ruta. Esta ruta se denota por  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$  y tiene una longitud  $n$ . Vemos el conjunto vacío de aristas como una ruta de longitud cero de  $a$  a  $a$ . Una ruta de longitud  $n \geq 1$  que comienza y termina en el mismo vértice se llama *circuito* o *ciclo*.

- Además, una arista en un grafo dirigido puede ocurrir más de una vez en una ruta.

## Ejemplo 3

¿Cuáles de los siguientes son caminos en el grafo dirigido que se muestra en la Figura 1:  $a, b, e, d$ ;  $a, e, c, d, b$ ;  $b, a, c, b, a, a, b$ ;  $d, c$ ;  $c, b, a$ ;  $e, b, a, b, a, b, e$ ? ¿Cuáles son las longitudes de esos caminos? ¿Cuáles de los caminos de esta lista son circuitos?




Figura 1: Grafo dirigido para el Ejemplo 3.

## Ejemplo 3

¿Cuáles de los siguientes son caminos en el grafo dirigido que se muestra en la Figura 1:  $a, b, e, d$ ;  $a, e, c, d, b$ ;  $b, a, c, b, a, a, b$ ;  $d, c$ ;  $c, b, a$ ;  $e, b, a, b, a, b, e$ ? ¿Cuáles son las longitudes de esos caminos? ¿Cuáles de los caminos de esta lista son circuitos?





Figura 1: Grafo dirigido para el Ejemplo 3.

*Solución:*


- Debido a que cada uno de  $(a, b)$ ,  $(b, e)$  y  $(e, d)$  es una arista,  $a, b, e, d$  es una ruta de longitud tres.

# Rutas en grafos dirigidos IV




- Como  $(c, d)$  no es una arista,  $a, e, c, d, b$  no es una ruta.

## Rutas en grafos dirigidos IV




- Además,  $b, a, c, b, a, a, b$  es un camino de longitud seis porque  $(b, a)$ ,  $(a, c)$ ,  $(c, b)$ ,  $(b, a)$ ,  $(a, a)$  y  $(a, b)$  son aristas.

# Rutas en grafos dirigidos IV




- Vemos que  $d, c$  es un camino de longitud uno, porque  $(d, c)$  es una arista.

# Rutas en grafos dirigidos IV



- También  $c, b, a$  es un camino de longitud dos, porque  $(c, b)$  y  $(b, a)$  son aristas.


# Rutas en grafos dirigidos IV



- Todos  $(e, b)$ ,  $(b, a)$ ,  $(a, b)$ ,  $(b, a)$ ,  $(a, b)$  y  $(b, e)$  son aristas, por lo que  $e, b, a, b, a, b, e$  es un camino de longitud seis.




## Rutas en grafos dirigidos IV



- Los dos caminos  $b, a, c, b, a, a, b$  y  $e, b, a, b, a, b, e$  son circuitos porque comienzan y terminan en el mismo vértice.

# Rutas en grafos dirigidos IV



- Los caminos  $a, b, e, d$ ;  $c, b, a$  y  $d, c$  no son circuitos.

- El término *ruta* también se aplica a las relaciones.

- Trasladando la definición de grafos dirigidos a relaciones, hay una **ruta** de  $a$  a  $b$  en  $R$  si hay una secuencia de elementos  $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$  con  $(a, x_1) \in R$ ,  $(x_1, x_2) \in R, \dots$  y  $(x_{n-1}, b) \in R$ .

- El teorema 1 puede obtenerse de la definición de una ruta en una relación.

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .
- Suponga que el teorema es cierto para el entero positivo  $n$  (esta es la hipótesis inductiva).



## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .
- Suponga que el teorema es cierto para el entero positivo  $n$  (esta es la hipótesis inductiva).
- Hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c \in A$  tal que hay un camino de longitud uno desde  $a$  hasta  $c$ , entonces  $(a, c) \in R$ , y un camino de longitud  $n$  de  $c$  a  $b$ , es decir,  $(c, b) \in R^n$ .

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .
- Suponga que el teorema es cierto para el entero positivo  $n$  (esta es la hipótesis inductiva).
- Hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c \in A$  tal que hay un camino de longitud uno desde  $a$  hasta  $c$ , entonces  $(a, c) \in R$ , y un camino de longitud  $n$  de  $c$  a  $b$ , es decir,  $(c, b) \in R^n$ .
- En consecuencia, según la hipótesis inductiva, hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c$  con  $(a, c) \in R$  y  $(c, b) \in R^n$ .

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .
- Suponga que el teorema es cierto para el entero positivo  $n$  (esta es la hipótesis inductiva).
- Hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c \in A$  tal que hay un camino de longitud uno desde  $a$  hasta  $c$ , entonces  $(a, c) \in R$ , y un camino de longitud  $n$  de  $c$  a  $b$ , es decir,  $(c, b) \in R^n$ .
- En consecuencia, según la hipótesis inductiva, hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c$  con  $(a, c) \in R$  y  $(c, b) \in R^n$ .
- Pero existe tal elemento si y sólo si  $(a, b) \in R^{n+1}$ .

## Teorema 1

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . Hay un camino de longitud  $n$ , donde  $n$  es un entero positivo, de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^n$ .

*Demostración:* Usaremos inducción matemática.

- Por definición, hay un camino de  $a$  a  $b$  de longitud uno si y sólo si  $(a, b) \in R$ , por lo que el teorema es verdadero cuando  $n = 1$ .
- Suponga que el teorema es cierto para el entero positivo  $n$  (esta es la hipótesis inductiva).
- Hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c \in A$  tal que hay un camino de longitud uno desde  $a$  hasta  $c$ , entonces  $(a, c) \in R$ , y un camino de longitud  $n$  de  $c$  a  $b$ , es decir,  $(c, b) \in R^n$ .
- En consecuencia, según la hipótesis inductiva, hay un camino de longitud  $n + 1$  desde  $a$  hasta  $b$  si y sólo si hay un elemento  $c$  con  $(a, c) \in R$  y  $(c, b) \in R^n$ .
- Pero existe tal elemento si y sólo si  $(a, b) \in R^{n+1}$ .
- Por lo tanto, hay un camino de longitud  $n + 1$  de  $a$  a  $b$  si y sólo si  $(a, b) \in R^{n+1}$ . ■

# Cerradura Transitiva I

- Ahora mostramos que encontrar la cerradura transitiva de una relación es equivalente a determinar qué pares de vértices en el grafo dirigido asociado están conectados por una ruta.

- Con esto en mente, definimos una nueva relación.

## Definición 3

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . La *relación de conectividad*  $R^*$  consta de los pares  $(a, b)$  tales que hay un camino de longitud al menos uno desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .

## Definición 3

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . La *relación de conectividad*  $R^*$  consta de los pares  $(a, b)$  tales que hay un camino de longitud al menos uno desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .

Dado que  $R^n$  consta de los pares  $(a, b)$  tales que hay un camino de longitud  $n$  desde  $a$  hasta  $b$ , se deduce que  $R^*$  es la unión de todos los conjuntos  $R^n$ .



## Definición 3

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ . La *relación de conectividad*  $R^*$  consta de los pares  $(a, b)$  tales que hay un camino de longitud al menos uno desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .

Dado que  $R^n$  consta de los pares  $(a, b)$  tales que hay un camino de longitud  $n$  desde  $a$  hasta  $b$ , se deduce que  $R^*$  es la unión de todos los conjuntos  $R^n$ . En otras palabras,

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n.$$

## Ejemplo 4

Sea  $R$  la relación sobre el conjunto de todas las personas en el mundo que contiene  $(a, b)$  si  $a$  ha conocido a  $b$ . ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo mayor que uno? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

## Ejemplo 4

Sea  $R$  la relación sobre el conjunto de todas las personas en el mundo que contiene  $(a, b)$  si  $a$  ha conocido a  $b$ . ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo mayor que uno? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- La relación  $R^2$  contiene  $(a, b)$  si hay una persona  $c$  tal que  $(a, c) \in R$  y  $(c, b) \in R$ , es decir, si hay una persona  $c$  tal que  $a$  ha conocido a  $c$  y  $c$  ha conocido a  $b$ .

## Ejemplo 4

Sea  $R$  la relación sobre el conjunto de todas las personas en el mundo que contiene  $(a, b)$  si  $a$  ha conocido a  $b$ . ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo mayor que uno? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- De manera similar,  $R^n$  consta de esos pares  $(a, b)$  tales que hay personas  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$  tales que  $a$  ha conocido a  $x_1$ ,  $x_1$  ha conocido a  $x_2, \dots$ , y  $x_{n-1}$  ha conocido a  $b$ .

## Ejemplo 4

Sea  $R$  la relación sobre el conjunto de todas las personas en el mundo que contiene  $(a, b)$  si  $a$  ha conocido a  $b$ . ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo mayor que uno? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- La relación  $R^*$  contiene  $(a, b)$  si hay una secuencia de personas, comenzando con  $a$  y terminando con  $b$ , de manera que cada persona en la secuencia ha conocido a la siguiente persona en la secuencia.

## Ejemplo 4

Sea  $R$  la relación sobre el conjunto de todas las personas en el mundo que contiene  $(a, b)$  si  $a$  ha conocido a  $b$ . ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo mayor que uno? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- Hay muchas conjeturas interesantes sobre  $R^*$ . ¿Crees que esta relación de conectividad incluye a la pareja contigo como primer elemento y al presidente de Mongolia como segundo elemento? □

## Ejemplo 5

Sea  $R$  la relación del conjunto de todas las paradas del metro en la ciudad de Nueva York que contiene  $(a, b)$  si es posible viajar desde la parada  $a$  hasta la parada  $b$  sin cambiar de tren. ¿Qué es  $R^n$  cuando  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

## Ejemplo 5

Sea  $R$  la relación del conjunto de todas las paradas del metro en la ciudad de Nueva York que contiene  $(a, b)$  si es posible viajar desde la parada  $a$  hasta la parada  $b$  sin cambiar de tren. ¿Qué es  $R^n$  cuando  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- La relación  $R^n$  contiene  $(a, b)$  si es posible viajar desde la parada  $a$  hasta la parada  $b$  haciendo como máximo  $n - 1$  cambios de trenes.



## Ejemplo 5

Sea  $R$  la relación del conjunto de todas las paradas del metro en la ciudad de Nueva York que contiene  $(a, b)$  si es posible viajar desde la parada  $a$  hasta la parada  $b$  sin cambiar de tren. ¿Qué es  $R^n$  cuando  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- La relación  $R^*$  consta de los pares ordenados  $(a, b)$  donde es posible viajar desde la parada  $a$  hasta la parada  $b$  haciendo tantos cambios de tren como sea necesario.  $\square$

## Ejemplo 6

Sea  $R$  la relación del conjunto de todos los estados de los Estados Unidos que contiene  $(a, b)$  si el estado  $a$  y el estado  $b$  tienen una frontera común. ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

## Ejemplo 6

Sea  $R$  la relación del conjunto de todos los estados de los Estados Unidos que contiene  $(a, b)$  si el estado  $a$  y el estado  $b$  tienen una frontera común. ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- La relación  $R^n$  consta de los pares  $(a, b)$ , donde es posible pasar del estado  $a$  al estado  $b$  cruzando exactamente  $n$  fronteras estatales.

## Ejemplo 6

Sea  $R$  la relación del conjunto de todos los estados de los Estados Unidos que contiene  $(a, b)$  si el estado  $a$  y el estado  $b$  tienen una frontera común. ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- $R^*$  consta de los pares ordenados  $(a, b)$ , donde es posible pasar del estado  $a$  al estado  $b$  cruzando tantas fronteras como sea necesario.

## Ejemplo 6

Sea  $R$  la relación del conjunto de todos los estados de los Estados Unidos que contiene  $(a, b)$  si el estado  $a$  y el estado  $b$  tienen una frontera común. ¿Qué es  $R^n$ , donde  $n$  es un número entero positivo? ¿Qué es  $R^*$ ?

*Solución:*

- Los únicos pares ordenados que no están en  $R^*$  son los que contienen estados que no están conectados a los Estados Unidos continentales (es decir, los pares que contienen Alaska o Hawaii).  $\square$

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- Tenga en cuenta que  $R^*$  contiene  $R$  por definición.

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- Para mostrar que  $R^*$  es la cerradura transitiva de  $R$ , también debemos mostrar que  $R^*$  es transitiva y que  $R^* \subseteq S$  siempre que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .



## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- Primero, mostramos que  $R^*$  es transitiva.

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- Si  $(a, b) \in R^*$  y  $(b, c) \in R^*$ , entonces hay caminos de  $a$  a  $b$  y de  $b$  a  $c$  en  $R$ .

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- Obtenemos un camino de  $a$  a  $c$  al comenzar con el camino de  $a$  a  $b$  y seguirlo con el camino de  $b$  a  $c$ . Por tanto,  $(a, c) \in R^*$ .

## Teorema 2

La cerradura transitiva de una relación  $R$  es igual a la relación de conectividad  $R^*$ .

*Demostración:*

- De ello se deduce que  $R^*$  es transitiva.

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .

# Cerradura Transitiva VI

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).

## Cerradura Transitiva VI

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).
- Aún más, ya que

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y  $S^k \subseteq S$ , se sigue que  $S^* \subseteq S$ .

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).
- Aún más, ya que

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y  $S^k \subseteq S$ , se sigue que  $S^* \subseteq S$ .

- Ahora observe que si  $R \subseteq S$ , entonces  $R^* \subseteq S^*$ , porque cualquier camino en  $R$  también es un camino en  $S$ .



- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).
- Aún más, ya que

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y  $S^k \subseteq S$ , se sigue que  $S^* \subseteq S$ .

- Ahora observe que si  $R \subseteq S$ , entonces  $R^* \subseteq S^*$ , porque cualquier camino en  $R$  también es un camino en  $S$ .
- En consecuencia,  $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ .

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).
- Aún más, ya que

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y  $S^k \subseteq S$ , se sigue que  $S^* \subseteq S$ .

- Ahora observe que si  $R \subseteq S$ , entonces  $R^* \subseteq S^*$ , porque cualquier camino en  $R$  también es un camino en  $S$ .
- En consecuencia,  $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ .
- Por lo tanto, cualquier relación transitiva que contenga  $R$  también debe contener  $R^*$ .

## Cerradura Transitiva VI

- Suponga ahora que  $S$  es una relación transitiva que contiene  $R$ .
- Dado que  $S$  es transitiva,  $S^n$  también es transitiva (el lector debe verificarlo) y  $S^n \subseteq S$  (según el Teorema 2 de las notas).
- Aún más, ya que

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y  $S^k \subseteq S$ , se sigue que  $S^* \subseteq S$ .

- Ahora observe que si  $R \subseteq S$ , entonces  $R^* \subseteq S^*$ , porque cualquier camino en  $R$  también es un camino en  $S$ .
- En consecuencia,  $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ .
- Por lo tanto, cualquier relación transitiva que contenga  $R$  también debe contener  $R^*$ .
- Así,  $R^*$  es la cerradura transitiva de  $R$ . ■

- Ahora que sabemos que la cerradura transitiva es igual a la relación de conectividad, dirigimos nuestra atención al problema de calcular esta relación.

- No es necesario examinar trayectorias arbitrariamente largas para determinar si existe una trayectoria entre dos vértices en un grafo dirigido finito.

- Como muestra el Lema 1, es suficiente examinar caminos que no contengan más de  $n$  aristas, donde  $n$  es el número de elementos del conjunto.

## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

- Suponga que hay un camino desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .



## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

- Suponga que hay un camino desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .
- Sea  $m$  la longitud del camino más corto.

## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

- Suponga que hay un camino desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .
- Sea  $m$  la longitud del camino más corto.
- Suponga que  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ , donde  $x_0 = a$  y  $x_m = b$ , es ese camino.

## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

- Suponga que hay un camino desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .
- Sea  $m$  la longitud del camino más corto.
- Suponga que  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ , donde  $x_0 = a$  y  $x_m = b$ , es ese camino.
- Suponga también que  $a = b$  y que  $m > n$ , de modo que  $m \geq n + 1$ .

## Lema 1

Sea  $A$  un conjunto con  $n$  elementos, y sea  $R$  una relación sobre  $A$ . Si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n$ . Además, cuando  $a \neq b$ , si hay un camino de longitud al menos uno en  $R$  desde  $a$  hasta  $b$ , entonces existe un camino con una longitud que no excede a  $n - 1$ .

*Demostración:*

- Suponga que hay un camino desde  $a$  hasta  $b$  en  $R$ .
- Sea  $m$  la longitud del camino más corto.
- Suponga que  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ , donde  $x_0 = a$  y  $x_m = b$ , es ese camino.
- Suponga también que  $a = b$  y que  $m > n$ , de modo que  $m \geq n + 1$ .
- Por el principio del casillero, porque hay  $n$  vértices en  $A$ , entre los  $m$  vértices  $x_0, x_1, \dots, x_{m-1}$ , al menos dos son iguales (ver Figura 2).

# Cerradura Transitiva IX




Figura 2: Produciendo un camino con longitud no mayor a  $n$ .




Figura 2: Produciendo un camino con longitud no mayor a  $n$ .

- Suponga que  $x_i = x_j$  con  $0 \leq i < j \leq m - 1$ .

# Cerradura Transitiva IX




Figura 2: Produciendo un camino con longitud no mayor a  $n$ .

- Suponga que  $x_i = x_j$  con  $0 \leq i < j \leq m - 1$ .
- Entonces, el camino contiene un circuito desde  $x_i$  a sí mismo.




Figura 2: Produciendo un camino con longitud no mayor a  $n$ .

- Suponga que  $x_i = x_j$  con  $0 \leq i < j \leq m - 1$ .
- Entonces, el camino contiene un circuito desde  $x_i$  a sí mismo.
- Este circuito se puede eliminar de la ruta de  $a$  a  $b$ , dejando una ruta, a saber,  $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$ , de  $a$  a  $b$  de menor longitud.



# Cerradura Transitiva IX




Figura 2: Produciendo un camino con longitud no mayor a  $n$ .

- Suponga que  $x_i = x_j$  con  $0 \leq i < j \leq m - 1$ .
- Entonces, el camino contiene un circuito desde  $x_i$  a sí mismo.
- Este circuito se puede eliminar de la ruta de  $a$  a  $b$ , dejando una ruta, a saber,  $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$ , de  $a$  a  $b$  de menor longitud.
- Por tanto, la ruta de menor longitud debe tener una longitud menor o igual que  $n$ . ■

- Del Lema 1, vemos que la cerradura transitiva de  $R$  es la unión de  $R, R^2, R^3, \dots$  y  $R^n$ .

- Esto se debe a que hay una ruta en  $R^*$  entre dos vértices si y sólo si hay una ruta entre estos vértices en  $R^i$ , para algún entero positivo  $i$  con  $i \leq n$ .

- Porque

$$R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$$

y la matriz cero-uno que representa una unión de relaciones es la unión de las matrices cero-uno de estas relaciones.

- La matriz cero-uno para la cerradura transitiva es la unión de las matrices cero-uno de las primeras  $n$  potencias de la matriz cero-uno de  $R$ .

## Teorema 3

Sea  $M_R$  la matriz cero-uno de la relación  $R$  sobre un conjunto con  $n$  elementos. Entonces la matriz cero-uno de la cerradura transitiva  $R^*$  es

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} \vee \dots \vee M_R^{[n]}.$$



## Ejemplo 7

Encuentre la matriz cero-uno de la cerradura transitiva de la relación  $R$  donde

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

*Solución:* Por el Teorema 3, se sigue que la matriz cero-uno de  $R^*$  es

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}$$

Dado que

$$M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

se sigue que

$$M_{R^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□



- El Teorema 3 se puede utilizar como base para un algoritmo para calcular la matriz de la relación  $R^*$ .

- Para encontrar esta matriz, se calculan las sucesivas potencias booleanas de  $M_R$ , hasta la  $n$ -ésima potencia.

- A medida que se calcula cada potencia, se forma su unión con la unión de todas las potencias menores.

- Cuando se hace esto con la  $n$ -ésima potencia, se ha encontrado la matriz para  $R^*$ .

- Este procedimiento se muestra en la Figura 3.


```
procedure transitive closure ( $\mathbf{M}_R$  : zero–one  $n \times n$  matrix)  
 $\mathbf{A} := \mathbf{M}_R$   
 $\mathbf{B} := \mathbf{A}$   
for  $i := 2$  to  $n$   
     $\mathbf{A} := \mathbf{A} \odot \mathbf{M}_R$   
     $\mathbf{B} := \mathbf{B} \vee \mathbf{A}$   
return  $\mathbf{B}$  { $\mathbf{B}$  is the zero–one matrix for  $R^*$ }
```

Figura 3: Un procedimiento para calcular la cerradura transitiva.


- 1 Sea  $R$  la relación del conjunto  $\{0, 1, 2, 3\}$  que contiene los pares ordenados  $(0, 1)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(2, 2)$  y  $(3, 0)$ . Encuentra la
  - 1 cerradura reflexiva de  $R$ .
  - 2 cerradura simétrica de  $R$ .
- 2 Sea  $R$  la relación  $\{(a, b) | a \neq b\}$  en el conjunto de enteros. ¿Cuál es la cerradura reflexiva de  $R$ ?
- 3 Dibuje el grafo dirigido de la cerradura reflexiva para cada una de las relaciones cuyos grafos dirigidos se muestran en la Figura 4.

# Ejercicios II

5.



6.



7.




Figura 4: Grafos dirigidos para los Ejercicios 3 y 4.

- 4 Dibuje el grafo dirigido de la cerradura simétrica para cada una de las relaciones cuyos grafos dirigidos se muestran en la Figura 4.



- 5 Sea  $R$  la relación del conjunto  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  que contiene los pares ordenados  $(1, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 5), (4, 3), (5, 1), (5, 2)$  y  $(5, 4)$ . Encuentre
- 1  $R^2$ .      2  $R^3$ .      3  $R^4$ .      4  $R^5$ .      5  $R^6$ .      6  $R^*$ .
- 6 Utilice el procedimiento de la Figura 3 para encontrar las Cerradura Transitiva de las siguientes relaciones sobre  $\{1, 2, 3, 4\}$ .
- 1  $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$ ,
- 2  $\{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$ ,
- 3  $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ ,
- 4  $\{(1, 1), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 2)\}$ .